

**Generelt**

Vælg forløbselement AHH 16, med forløbslabel "Graviditet, fødsel og barsel".

I ambulans kontakt forud for kir. abort, vælg aktionsdiagnosen DZ322 "Undersøgelse forud for provokeret abort".

Når Mifegyne og/eller Cytotec udleveres, kodes dette i "Ydelseskodning" (se ydelser nedenfor).

Fremsøg relevant aktionsdiagnose i diagnoselisten (se diagnoser nedenfor).

Ved provokeret abort anvendes GA (fastsat ved UL) svarende til den dag aborten opstartes medicinsk, eller udføres kirurgisk. Ved missed abortion eller spontane aborter kodes GA (ud fra SM) svarende til den dag, hvor man konstaterer at fosteret er gået til.

Den dag aborten opstartes medicinsk, eller udføres kirurgisk udfyldes "**Obstetrisk historik**". **Klik "Tilføj tidligere graviditeter" og anfør følgende: dato for abort, GA samt aborttype.** Husk derefter at klikke på "**Marker som gennemgået**".

Eventuelle komplikationer (DO08\*-koder) registreres som bidiagnoser.

Ved ny patientkontakt pga. komplikation i efterforløbet anvendes komplikationsdiagnose DO08\* som aktionsdiagnose.

Hvis pt efterfølgende kommer til ambulans kontrol, eller der er telefonisk kontakt med pt (fx til HCG-svar) "løses" abortdiagnosen i diagnoselisten, og der kodes med DZ098C "Kontrolundersøgelse efter abort IKA".

		Kriterier og anvendelse
<b>Provokeret abort før 12 uger</b>		
<b>Diagnose</b>		
DO049	Provokeret abort før 12 graviditetsuger UNS	
<b>Ydelser</b>		
BKHD42	Medicinsk induceret abort med antiprogesteron og prostaglandin før 12 graviditetsuger	Mifegyne + Cytotec
KLCH03	Provokeret abort ved vakuumaspiration	
KLCH00	Provokeret abort ved curettage	
<b>Missed abortion</b>		
<b>Diagnoser</b>		
DO020	Graviditet uden erkendt foster (blighted ovum)	
DO021	Graviditet med dødt retineret foster (missed abortion)	Ved minimal blødning (ellers DO03*)
<b>Ydelser</b>		
BKHD52	Behandling med antiprogesteron og prostaglandin	Mifegyne + Cytotec
KMBA00	Vakuumaspiration efter fødsel eller abort	
<b>Ekstrauterin graviditet</b>		
<b>Diagnose</b>		
DO009	Ektopisk graviditet UNS.	For specificerede koder DO00*-DO008* se SKS-browseren
<b>Ydelser</b>		
KLBE01	Laparoskopisk enkeltsidig salpingektomi	Husk tillægskode for angivelse af side: højre tul1, venstre tul2
KLBE00	Enkeltsidig salpingektomi	<b>Åbent indgreb.</b> Husk tillægskode for angivelse af side: højre tul1, venstre tul2
KLBC21	Laparoskopisk fjernelse af tubagraviditet med tubotomi	<b>Salpinxbevarende</b> Husk tillægskode for angivelse af side: højre tul1, venstre tul2
BKHE8A	Behandling med methotrexat ved ekstrauterin graviditet eller mola	
<b>Spontan abort</b>		
Ved sene spontane aborter efter 16 uger skal også tilføjes som tillægskode hvorvidt der var mistanke om misdannelser hos fosteret.		
<b>Diagnoser</b>		
DO200	Truende abort	Ved vandafgang, blødning eller smerter, hvor fosteret stadig er i live
DO030	Inkomplet spontan abort kompliceret med underlivsinfektion	
DO031	Inkomplet spontan abort kompliceret med sen eller excessiv blødning	Ved medicinsk eller kirurgisk behandling.
DO034	Inkomplet spontan abort uden komplikation	
DO039	Komplet eller ikke specificeret <b>spontan abort uden komplikation</b>	Denne kode anvendes hvis ingen medicinsk el kirurgisk behandling.
<b>Ydelser</b>		
BKHD50	Behandling med prostaglandin	Cytotec
BKHD52	Behandling med antiprogesteron og prostaglandin	Mifegyne + Cytotec
KMBA00	Vakuumaspiration efter fødsel eller abort	

<b>PUL</b> (Pregnancy with unknown location)		
<b>Diagnoser</b>		
DZ321L	Bekræftet graviditet med ukendt lokalisation (PUL)	DZ321L anvendes indtil pt afsluttes (se nedenfor)
DO009	Ektopisk graviditet UNS.	når HCG<3 og pt afsluttes redigeres DZ321L til DO039 eller DO009, alt efter hvad der er mest sandsynligt. Diagnosen "løses". GA og dato for udfald registreres i obst. historik.
DO039	Komplet eller ikke specificeret spontan abort uden komplikation	
DO022	Afsluttet graviditet med ukendt lokalisation (PUL)	Denne diagnose anvendes KUN hvis det ved afslutning af pt er helt umuligt at differentiere mellem DO009 og DO039.
<b>Mola</b>		
<b>Diagnoser</b>		
DZ038O	Observation pga. mistanke om sygdom i forbindelse med graviditet, fødsel eller barsel.	Der registreres med tillægskode DO019 Mola UNS indtil mik svar.
DO010	Komplet mola	Husk cancerregistrering.
DO011	Inkomplet mola	Husk cancerregistrering.
<b>Provokerede sene aborter</b>		
<p>Ved ab pro fra 12+0 skal tilføjes baggrund for samrådsabort, og hvorvidt der var mistanke om misdannelser hos fosteret. Dette registreres som tillægskode til abort-aktionsdiagnosen.</p> <p>Hvis misdannelser eller mistanke om misdannelser, er relevant DQ*- diagnose obligatorisk.</p> <p>Hvis der er en stork i headeren (fordi pt har et graviditetsforløb), gå til "<b>Obstetrisk historik</b>" og klik på den linje som er indeværende graviditet. Klik "<b>Tilføj nyfødt baby</b>", og <b>anfør dato for abort og udfald (aborttype)</b>. Husk derefter at klikke på "<b>Marker som gennemgået</b>".</p> <p>Hvis der <i>ikke</i> er en stork i headeren, gå i "Obstetrisk historik" som anført i boksen på første side.</p> <p>OBS Ved abort, hvor fosteret kvitteres &gt; GA 21+6, eller hvor fosteret viser livstegn (uanset GA), kræves fuld fødselsindberetning. Der registreres med DO836 eller DO846 som aktionsdiagnose, samt abortkode DO050 eller DO059 som bidiagnose.</p>		
<b>Diagnoser</b>		
DO050	Provokeret abort efter udgangen af 12. graviditetsuge <b>uden</b> samrådstilladelse ved fare for kvindens liv eller helbred	
DO059	Provokeret abort efter udgangen af 12. graviditetsuge <b>med</b> samrådstilladelse	
<b>Ydelser</b>		
BKHD46	Medicinsk Induceret sen abort med antiprogesteron og prostaglandin	Mifegyne+Cytotec
BKHD44	Medicinsk induceret sen abort med antiprogesteron	Mifegyne
BKHD45	Medicinsk induceret sen abort med prostaglandin	Cytotec
KMBA00	Vakuumaspiration efter fødsel eller abort	Ved retineret væv/placenta
<b>Andre ydelser (relevant ved alle typer abort)</b>		
KLWW00	Re-evakuering af livmoder efter provokeret abort	Efter tidl. <b>kirurgisk</b> abort.
KMWW00	Re-evacuatio uteri efter fødsel eller spontan abort	Efter tidl. evac pga. <b>spontan</b> abort.
KMBA00	Vakuumaspiration efter fødsel eller abort	Efter <b>medicinsk</b> abort eller spontan abort.
KMBA03	Udskrabning efter fødsel eller abort	Med curette.
NAAD0B	Epidural blokade til smertelindring	
NAAC	Generel anæstesi	
BPMD01C	Rhesusprofylakse efter afsluttet graviditet	
BJCZ00	Indlæggelse af spiral med kobber	
BJCZ01	Indlæggelse af spiral med hormon	
<b>Øvrige diagnoser</b>		
DO081G	Blødning efter abort	Som indikation for evac eller medicinsk behandling.
DO079	Fortsat levende graviditet efter provokeret abort	Ved fortsat levende graviditet.
DO088L	Retineret væv efter abort	
DO209	Blødning tidligt i graviditeten UNS	Ved GA < 22+0
DZ321C	Intrauterin graviditet bekræftet ved ultralyd	
<b>Ambulant efterforløb (uanset abort-type)</b>		
<b>Diagnose</b>		
DZ098C	Kontrolundersøgelse efter abort IKA	

Ved spørgsmål kontaktes Mette Mandrup (3862 0418), Lene Eskildsen (2036 2825), Stine Anthony (2036 2841), Pia Staal (4029 0663) eller Mads Breining (3862 1834),