



Hvidovre Hospital
Att.: Ledende overlæge Charlotte Wilken-Jensen
Gynækologisk Obstetrisk afd.
Kettegårds Alle 30
2650 Hvidovre

Afsnit 2034

Telefon: 3545 4792

Ref.: LHH

Dato: 04.11.2011

Orientering vedr. akutte screen analyser af gravide/fødende for HIV og HBV samt rådgivning herefter.

Der er i dag - både i dagarbejdstid og i vagttidsrummet - mulighed for at få stillet en akut diagnose på gravide/fødende for HIV og HBV, med henblik på hhv. PEP behandling af barnet ved HIV positive mødre og vaccination og behandling med hepatitis B immunglobulin ved HBsAg positive mødre.

Diagnosen stilles ved screeningsanalyse for hhv. anti-HIV1/2 og HBsAg og foregår i Blodbanken på Rigshospitalet. Analyserne rekvireres ved kontakt til og efter aftale med den vagthavende læge på Klinisk Immunologisk Afdeling, Blodbanken. (Dagtid på hverdage ; 3545-1401 og i vagtperioden 3545-2031, der formidler kontakten).

De akutte analyser tilbydes til fødende kvinder, der er i risikogruppe for HBV eller HIV infektion (dvs. kommer fra middel- eller højdemiske områder, er prostitueret, er misbruger eller partner til samme).

For fødende udenfor risikogruppe, vil virus screen blive udført som rutineanalyse den førstkomende hverdag. Dette gælder også, hvis der er tale om andre smitteanalyser.

For de fødende udenfor risikogruppe med ukendt HBsAg status, vil pædiatere blive rådet til at vaccinere barnet mod HBV uden at give Hepatitis B immunglobulin.

Revaccination er naturligvis ikke nødvendigt, hvis mater senere viser sig at være HBsAg negativ.

De anførte retningslinjer er konfereret med infektionsmedicinere og børnelæger på Rigshospitalet og epidemiologer fra SSI.

Med venlig hilsen

Henrik Ullum MD. Ph.D

Overlæge

Klinisk Immunologisk Afdeling, 2031

Rigshospitalet

Blegdamsvej 9

2100 København Ø