

Patientinformation

Information til patienter med ønske om graviditet og hvor vi har mistanke om at graviditeten sidder uden for livmoderen

Hvad fejler jeg?

Ultralydsundersøgelsen og målingerne af graviditetshormonet i blodet tyder på, at du har en graviditet uden for livmoderen. Oftest sidder graviditeten i æglederen. Er du interesseret i at bevare den ægleder, hvor graviditeten sidder, er der i dag flere muligheder for behandling. Vi kan ikke i dag med 100% sikkerhed sige hvilken behandling, der er bedst.

Kirurgisk behandling

Behandlingen har tidligere udelukkende bestået af operation. En sådan vil i de fleste tilfælde kunne foregå ved hjælp af en kikkert. I andre tilfælde må man gennem et bikinisnit fjerne graviditeten fra æglederen eller fjerne hele den ægleder, hvor graviditeten sidder. Alvorlige komplikationer ved bedøvelse og operation er meget sjældne.

Ved den kirurgiske behandling, er vi så skånsomme som muligt ved æglederen, med mindre vi har aftalt at fjerne æglederen. Den mest anvendte metode her på afdelingen, er den kirurgiske behandling.


Medicinsk behandling

Gennem de seneste år har man især i udlandet benyttet en medicinsk behandlingsmetode, hvorved operation som regel undgås. Behandlingen består af én (eventuelt to) indsprøjtning(-er) af Methotrexat. Det har vist sig, at små doser af dette cellehæmmende stof får graviditeten i æglederen til at gå til grunde.

Mulighederne for senere at opnå en normal graviditet på naturlig måde, er nok lidt bedre ved medicinsk behandling (70% bliver gravide på naturlig måde) end ved operation (60% bliver gravide). På den anden side har du efter medicinsk behandling, større risiko for at en ekstra behandling bliver nødvendig (ca ¼ får fornyet behandling). medicinsk behandling eller en kirurgisk behandling alligevel bliver nødvendig (26%) i forhold til risikoen ved den kirurgiske (13%).

Behandlingen kan medføre forbigående bivirkninger 1 til 2 døgn efter indsprøjtningen i form af let kvalme eller madlede. Enkelte har bemærket blister i mundhulen. Tages medicinen kun en gang, er alvorlige bivirkningerne meget sjældne og har altid været forbigående.

Giver vi dig den medicinske behandling, er det naturligvis ekstra vigtigt, at vi har



udelukket at graviditeten sidder inde i livmoderen, og måske bare vokser lidt langsomt. Derfor kan der gå længere tid fra den første dag du har været på hospitalet til vi kan starte den medicinske behandling (flere blodprøver, flere kontroller mv)

Det er naturligvis helt frivilligt om du foretrækker den ene eller den anden behandling.

Efterkontroller

Hvad enten du behandles kirurgisk eller medicinsk, skal der almindeligvis tages nogle blodprøver på dig i efterforløbet. Dette skyldes, at der kan være lidt graviditetsvæv i æglederen efter operationen eller at medicinen ikke har fået bugt med alt graviditetsvævet. I den situation kan det være nødvendigt med yderligere behandling (kirurgisk eller medicinsk).

Både ved medicinsk behandling og operation skal du forvente at føle nogen smerte fra stedet, hvor graviditeten har siddet. Smerten kan almindeligvis mærkes i op til 1-4 uger efter, at behandlingen er afsluttet.

Hvornår må jeg blive gravid igen?

Efter begge behandlinger skal du vente 2 måneder før du forsøger at blive gravid igen.

Med venlig hilsen

Lægerne på gynækologisk afdeling